

Coordonnées du patient = NOM / Prénom / Date de naissance

Votre patient a débuté et suit une ITA qui doit être poursuivie entre 3 et 5 ans afin d'obtenir une amélioration clinique satisfaisante et durable.

- ⇒ Date de début de l'ITA =
- ⇒ Date de fin théorique de l'ITA recommandée par l'allergologue initiateur =

Pourquoi l'ITA ?

Indication chez le patient =

Comment votre patient a initié son traitement d'ITA ?

- ⇒ Prise du premier comprimé dosé à 100 IR au cabinet de l'allergologue pour vérifier l'absence d'effets indésirables rédhibitoires
- ⇒ Prise de 2 comprimés dosés à 100 IR le jour suivant à domicile
- ⇒ A partir du troisième jour, prise d'1 comprimé dosé à 300 IR 1 fois par jour
- ⇒ Votre patient peut avoir effectué une montée de dose sur plus de 3 jours en fonction de l'appréciation de l'allergologue.

Comment poursuivre l'ITA ? Votre patient est en phase d'entretien =

- ⇒ 1 fois par jour toute l'année
- ⇒ Prendre 1 comprimé, laisser fondre environ 1 minute sous la langue, puis cracher ou avaler
- ⇒ Si le traitement est oublié, il peut être pris à un autre moment dans la journée
- ⇒ Traitement à conserver comme un traitement classique à température ambiante
- ⇒ Le patient peut prendre un traitement symptomatique de façon concomitante (antihistaminiques notamment)

Consultation de suivi : tous les 6 mois.

- ⇒ Recherche d'effets secondaires : prurit/œdème sublinguaux, épigastralgies
- ⇒ Vérification de la bonne observance du traitement pour favoriser l'efficacité
- ⇒ Contrôle de la rhinite / contrôle de l'asthme
- ⇒ Ré adressage à l'allergologue : non efficacité du traitement après 1 an, aucune diminution des traitements symptomatiques, épigastralgies importantes, asthme non contrôlé, mauvaise observance de cette forme de désensibilisation.

Remarques :

- ⇒ Le traitement n'est pas contre indiqué en cas de déclaration de grossesse. En cas de doute, en référer à un spécialiste en allergologie, par exemple par téléexpertise.
Pensez à vérifier la compatibilité de ses antihistaminiques actuels avec une grossesse.
- ⇒ Traitements concomitants : pas d'interaction
- ⇒ Le traitement est à arrêter ponctuellement si plaie buccale ou syndrome infectieux

Ce traitement est disponible en pharmacie, il doit être prescrit sur une ordonnance simple.

Il est présent dans les bases médicaments des logiciels médicaux.

- ⇒ ORYLMYTE 300IR 1 comprimé par jour pendant 6 mois

Contacts :

Laboratoire Stallergenes-Greer

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Si vous êtes patient : 01 55 59 20 60

Si vous êtes professionnel de santé : 01 55 59 20 15