

NAME
ALLERGIEN

Vorname

NOTFALLTASCHE

Verfalldatum

1. Adrenalin
2. Bronchodilatator
+ SPACER
3. Antihistaminikum
4. Verschiedenes

FASTJEKT (EPIPEN)



Die blaue Sicherungskappe abziehen. "Blau zum Himmel, orange zum Oberschenkel"



Das orange Ende muss zur Außenseite des Oberschenkels zeigen



Stoßen Sie im rechten Winkel (90°) kräftig in die Außenseite des Oberschenkels und halten Sie ihn 10 Sekunden fest gegen den Oberschenkel gepresst



Massieren Sie dann den Injektionsbereich

JEXT



Ziehen Sie die gelbe Sicherungskappe ab



Halten Sie den schwarzen Nadelschutz in einem rechten Winkel (circa 90°) an die Außenseite des Oberschenkels




Drücken Sie den schwarzen Nadelschutz fest gegen die Außenseite des Oberschenkels, bis Sie ein Klicken hören. Halten Sie den Injektor für 10 Sekunden fest in dieser Position. Massieren Sie den Bereich um die Injektionsstelle



Massieren Sie den Bereich um die Injektionsstelle

ANAPEN

Code: 34-009



Ziehen Sie die schwarze Nadelkappe (in Pfeilrichtung) ab. Dazu muss man kräftig ziehen



Entfernen Sie die graue Sicherungskappe vom roten Auslöseknopf



Halten Sie das offene Ende des Anapen gegen die Außenseite Ihres Oberschenkels




Drücken Sie auf den roten Auslöseknopf, bis ein Klicken zu hören ist. Halten Sie den Autoinjektor etwa 10 Sekunden. Massieren Sie die Injektionsstelle leicht

EMERADE



Entfernen Sie die Schutzkappe der Nadel




Legen Sie Emerade an die Außenseite des Oberschenkels an und drücken Sie gegen den Oberschenkel. Halten Sie Emerade für ca. 5 Sekunden gegen den Oberschenkel



Massieren Sie danach leicht den Bereich der Injektionsstelle

EINE ALLERGISCHE REAKTION

ICH BEURTEILE SOFORT DEN SCHWEREGRAD DER REAKTION



REAKTION SOFORT SCHWER

- Meine Stimme verändert sich
- Ich atme schlecht, ich pfeife, ich huste
- Ich habe starke Bauchschmerzen
- Ich muss mich übergeben
- Die Hände, Füße, Kopfhaut jucken
- Ich fühle mich schlecht oder komisch
- Ich werde ohnmächtig

Andere Symptome

Das kann eine schwere Reaktion sein, vor allem, wenn mehrere Symptome gleichzeitig auftreten

REAKTION SIEHT LEICHT AUS

- Mein Mund piekt oder juckt
- Meine Nase läuft, meine Augen jucken
- Meine Lippen schwellen an
- Rote Flecken, die jucken
- Ich habe ein wenig Bauchschmerzen
- Und mir ist übel

Andere Symptome

Aber ich SPRECHE
und ATME normal

DIE GUTEN REFLEXE

1. Kind hinlegen oder bei Atemnot in halbaufrechter Position hinsetzen
2. In den Oberschenkel außen injizieren
3. Den Notarzt anrufen (112)
4. Bei Atemnot: 4-10 Hübe mit dem Spacer geben
wenn notwendig nach 10-15 Minuten wiederholen
- 5.

Beim warten auf den Notarzt kann eine 2. Injektion mit gemacht werden, wenn die Symptome nach 5 oder mehr Minuten anhalten

DIE GUTEN REFLEXE

- 1.
- 2.
3. Das Kind bis zum Verschwinden der Symptome überwachen
4. Die Eltern benachrichtigen, den behandelnden Arzt verständigen

Bei nicht eintretender Besserung muss der Schweregrad der Reaktion erneut beurteilt werden