

**APELLIDO**  
**ALERGIAS**

**Nombre**

**KIT DE EMERGENCIAS**

fecha de caducidad

1. Adrenalina
2. Broncodilatador con espaciador
3. Antihistamínico
4. Otros

**ALTELLUS**  
(EPIPEN)



Retire la tapa azul



Coloque el extremo naranja del dispositivo sobre la parte externa del muslo



Presione fuertemente la punta naranja contra el muslo hasta escuchar un clic y manténgalo presionado por 10 segundos



Luego haga un masaje sobre la zona inyectada

**JEXT**



Retire la tapa amarilla



Coloque el extremo negro del dispositivo sobre la parte externa de muslo



Presione enérgicamente hasta escuchar un clic y manténgalo apoyado contra el muslo por 10 segundos



Luego haga un masaje sobre la zona inyectada

**ANAPEN**

Code: 34-009



Retire el cobertor negro que protege la aguja



Retire la tapa gris de seguridad del botón rojo



Coloque fuertemente el dispositivo sobre la parte externa del muslo



Luego presione el botón inyector rojo y manténgalo presionado durante 10 segundos. Después haga un masaje en la zona de inyección

**EMERADE**



Retira la tapa protectora de la aguja




Coloque y presione el dispositivo contra la parte externa del muslo. Mantenga el dispositivo apoyado contra el muslo unos 5 segundos



Masaje ligeramente la zona de inyección

UNA REACCION ALÉRGICA

EVALUO INMEDIATAMENTE LA GRAVEDAD DE LA REACCIÓN



**LA REACCION ES GRAVE**  
si presenta 1 de los siguientes signos

- Me cambia la voz
- Me cuesta respirar, me silba el pecho o me da tos
- Me duele mucho el abdomen, vomito
- Picazón de manos, pies o cuero cabelludo
- Me siento mal o raro
- Me desmayo
- Otros signos

Esta reacción puede ser más severa en caso de asociar varios de estos signos

**LA REACCION ES MODERADA SI**

- Me pica la boca, se me hinchan los labios
- Me pican los ojos, mi nariz gotea mocos
- Me salen ronchas rojas que pican
- Me duele un poco el abdomen y tengo ganas de vomitar
- Otros signos

SIN EMBARGO PUEDO HABLAR Y RESPIRAR BIEN

**LA CONDUCTA CORRECTA**

1. Acostar al niño o dejarlo semisentado en caso de costarle respirar
2. Inyectar en la parte antero-externa de Muslo
3. Luego llamar al SAMU (15 ó 112)
4. Si dificultad respiratoria: aplicar con el espaciador hasta 4 a 10 aplicaciones, se pueden repetir según la dificultad respiratoria luego de 10 a 15 min
- 5.

Mientras espera que llegue la ayuda puede inyectar una segunda dosis de si los síntomas luego de 5 min o más

**LA CONDUCTA CORRECTA**

1. Vigilar al niño hasta que desaparezcan los síntomas
2. Vigilar al niño hasta que desaparezcan los síntomas
3. Vigilar al niño hasta que desaparezcan los síntomas
4. Avisar a los padres y contactar al médico

SI EL NIÑO NO MEJORA DEBO EVALUAR DE NUEVO LA GRAVEDAD