

Fiche d'aide à destination des médecins non allergologues
Document à l'initiative et établi par la Société Française d'Allergologie
Suivi de traitement d'ImmunoThérapie Allergénique (ITA = désensibilisation)

STALORAL

Coordonnées du patient = NOM / Prénom / Date de naissance

Votre patient a débuté et suit une ITA qui doit être poursuivie entre 3 et 5 ans afin d'obtenir une amélioration clinique satisfaisante et durable.

- ⇒ Date de début de l'ITA =
- ⇒ Date de fin théorique de l'ITA recommandée par l'allergologue initiateur =

Pourquoi l'ITA ?

Indication chez le patient =

Comment votre patient a initié son traitement d'ITA ?

- ⇒ La phase d'initiation a été réalisée par une montée progressive de dose.
- ⇒ Plusieurs protocoles sont possibles pour cette montée de dose.

Comment poursuivre l'ITA ? Votre patient est en phase d'entretien =

- ⇒ 1 fois par jour toute l'année ou du _____ au _____
- ⇒ Prendre 5 pressions, laisser 2 minutes sous la langue, puis cracher ou avaler
- ⇒ Si le traitement est oublié, il peut être pris à un autre moment dans la journée
- ⇒ Le patient peut prendre un traitement symptomatique de façon concomitante (antihistaminiques notamment)
- ⇒ Traitement à conserver au réfrigérateur

Consultation de suivi : tous les 6 mois

- ⇒ Recherche d'effets secondaires : prurit/œdème sublinguaux, épigastralgies
- ⇒ Vérification de la bonne observance du traitement pour favoriser l'efficacité
- ⇒ Contrôle de la rhinite / contrôle de l'asthme
- ⇒ Ré adressage à l'allergologue : non efficacité du traitement après 1 an, aucune diminution des traitements symptomatiques, épigastralgies importantes, asthme non contrôlé, mauvaise observance de cette forme de désensibilisation.

Remarques :

- ⇒ Le traitement n'est pas contre indiqué en cas de déclaration de grossesse. En cas de doute, en référer à un spécialiste en allergologie, par exemple par téléexpertise.
Pensez à vérifier la compatibilité de ses antihistaminiques actuels avec une grossesse.
- ⇒ Traitements concomitants : pas d'interaction
- ⇒ Le traitement est à arrêter ponctuellement si plaie buccale ou syndrome infectieux

L'ordonnance est faite sur une ordonnance simple =

STALORAL 300 IR (allergène : _____)

5 pressions tous les jours, nombre de flacons (20 flacons pour 6 mois)

Ces traitements ne sont pas délivrables en pharmacie.

Le patient devra ensuite adresser son ordonnance au laboratoire pour une livraison à domicile du traitement. Le délai de livraison est de 15 jours.

Contacts :

Laboratoire Stallergenes-Greer

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Si vous êtes patient : 01 55 59 20 60

Si vous êtes professionnel de santé : 01 55 59 20 15

Site internet : www.ordoizy.com